

**Algemene informatie:** Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Mocht u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen hebben, neem dan contact op met:

Omega Pharma Nederland B.V. • Postbus 6612 • 3002 AP Rotterdam  
 Consumentenservice: 0800 - 020 20 20 • E-mail: info@bional.nl • www.bional.nl

### Ingrediënten

Verstevigingsmiddel: microkristallijne cellulose, asperge-extract, cranberryextract, vossenbesextract, anti-klontermiddelen: talk, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, vitamine C, bevochtigingsmiddelen: vernet cellulosegom, glycerol, verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, kleurstoffen: bietenrood, titaandioxide, ijzeroxide.

### Samenstelling

Een dagdosering van 1-4 tablet(ten) bevat:  
 200-800 mg Cranberry-extract (*Vaccinium macrocarpon*)  
 200-800 mg Vossenbesextract (*Vaccinium vitis-idaea*)  
 200-800 mg Asperge-extract (*Asparagus officinalis*)  
 30-120 mg Vitamine C (L-ascorbinezuur) (37-150% ADH\*)

\*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

### Toedieningsvorm en inhoud

Verpakking met 40 tabletten (4 blisters à 10 tabletten).

### Eigenschappen en invloed

Een goede weerstand is van belang om een goede gezondheid te behouden. Bional Cranberry bestaat uit een combinatie van cranberry, vossenbes, asperge en vitamine C. Vitamine C is één van de bekendste vitamines en is goed voor de weerstand en ondersteunt de afweer van het lichaam.

Bional Cranberry kan als kuur worden gebruikt.

Goed voor de weerstand	Vitamine C
Ondersteunt de afweer van het lichaam	Vitamine C

### Niet te gebruiken bij

Er zijn geen speciale situaties bekend waarbij dit product niet gebruikt kan worden.

### Waarschuwingen

Buiten bereik van jonge kinderen bewaren. In zeer zeldzame gevallen kan er overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen bestaan. Er zijn geen aanvullende richtlijnen bij het gebruik van Cranberry bij ouderen of speciale consumentengroepen.

### Combinatie met andere middelen

Over de invloed van het gelijktijdig innemen van dit product met andere middelen is niets bekend. Raadpleeg uw arts/apotheker.

### Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie

Dit product kan beter niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.

### Dosering

Kuur: gedurende 10 dagen 1 x daags 2 tabletten met water innemen, 2 uur na de avondmaaltijd. Dit mag worden verhoogd naar 2 x daags 2 tabletten ('s ochtends en 's avonds 2 uur na de maaltijd met water innemen). Voor langdurige ondersteuning en/of onderhoudsdosering 1 x daags 1 tablet met water innemen, 2 uur na de avondmaaltijd. Het is belangrijk om voldoende water te drinken (1 1/2-2 liter per dag).

### Wat te doen indien vergeten is een dosering in te nemen

Neem de dosis alsnog wanneer u merkt dat u deze vergeten bent in te nemen, tenzij u het pas ontdekt wanneer het bijna tijd is voor uw volgende dosis. In dat laatste geval moet u de dosis niet extra innemen maar gewoon uw schema verder volgen. Het is belangrijk de tabletten volgens schema in te nemen.

### Wijze van bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge en donkere plaats bewaren.

### Ten minste houdbaar tot einde

Zie opdruk verpakking.

### Datum aangepast

Oktober 2012